Journal Homepage: - www.journalijar.com

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH (IJAR)

Article DOI: 10.21474/IJAR01/10568
DOI URL: <http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/10568>

RESEARCH ARTICLE

MIGRATION INTRA VESICALE D'UN DISPOSITIF INTRA-UTERIN CAS CLINIQUE ET REVUE DE LA LITTERATURE

Youssef Halime, Soufiane Ennaciri, Mustapha Ahsaini, Soufiane Mellas, J.El. Ammari, Mf.Tazi, Mj. El. Fassi and Mh. Farih

Service D'Urologie - CHU Hassan II Fès.

Manuscript Info

Manuscript History

Received: 22 December 2019

Final Accepted: 25 January 2020

Published: February 2020

Key words:-

Bladder Stones, Intra-Uterine device,
Intra - Vesical Migration

Abstract

Transuterine migration of intrauterine device (IUD) is a rare complication. We report here a case of an IUD that has partially migrated into the bladder. It was a 37-year-old patient, in whom the IUD was inserted more than 7 years ago and who initially consulted for dysuria and urinary irritant syndrome, X-ray of abdomen performed as part of the exploration of bladder stone lead to the Intra-vesical migration of intra-uterine device. The partially intra vesical migration was confirmed by cystoscopy and CT. The ablation of IUD and bladder stone is carried out by cystotomy. This rare complication should not cast doubt on the effectiveness of the IUD when it is inserted in the rules of art.

Copy Right, IJAR, 2020,. All rights reserved.

Introduction:-

Le DIU est le moyen contraceptif le plus utilisé aujourd'hui à travers le monde, de part son efficacité et la simplicité de son insertion. En effet, il est porté par près de 100 millions de femmes.

Son insertion est un acte médical de routine toutefois certaines complications peuvent se voir : l'expulsion, l'infection ou la perforation et migration [1].

La migration trans-utérine du stérilet est une complication rare mais non exceptionnelle. Son incidence est estimée dans la littérature de 1/10 000 insertions à 1/350 insertions [3, 4].

Après une perforation, le DIU peut migrer dans les différents organes de voisinage, le plus souvent vers la cavité abdominale et plus rarement vers le pelvis, notamment dans la vessie qui est la plus fréquemment atteinte. [4].

Le traitement dépend de la localisation du DIU et de ses éventuelles complications.

Nous rapportons un nouveau cas de migration trans-utéro-vésicale d'un DIU

Observation:-

Patiente âgée de 37 ans, G3P3 (accouchements par voie basse), sous contraception orale depuis 05 ans, sans antécédents pathologiques notable a présenté depuis 1 mois une dysurie avec un syndrome irritatif fait de brûlure mictionnelles et de pollakiurie. L'examen clinique était sans particularité. L'examen cyto bactériologique des urines (ECBU) est revenu négatif. L'échographie pelvienne a montré la présence d'un macro calcul sans retentissement sur les voies excrétrices (Figure 1). L'examen radiologique a été complété par une radiographie de l'abdomen sans

Corresponding Author:- Youssef Halime

Address:- Service D'Urologie - CHU Hassan II Fès.

préparation qui a objectivé une opacité en T dans la cavité abdominale (Figure 2) faisant évoquer un DIU et éliminant de ce fait l'éventualité de l'expulsion du stérilet rapportée par la patiente et qui remonte à plus de 08 ans.

La cystoscopie retrouve un stérilet calcifié et incrusté dans la paroi postérieure de vessie avec présence d'un macro calcul.

La tomодensitométrie abdominopelvienne (Figure 3, 4) a mis en évidence le caractère trans-vésical de la partie du stérilet non visualisé à l'échographie et à la cystoscopie. Il atteignait la graisse sous péritonéale, en regard de l'utérus.

Vu le caractère calcifié, trans vésical du DIU et une possible fistule vesico-utérine, il a été décidé d'extraire le stérilet ainsi que le calcul par laparotomie, (Figure 5). L'opération a été réalisée sans difficulté particulière. Une sonde urinaire a été laissée en place 10 jours puis retirée, la cystographie de contrôle n'a pas objectivé de fistule.

Discussion:-

Le stérilet est un dispositif contraceptif réversible inventé en 1928 par Ernst Gräfenberg [3]. Il s'agit d'un petit objet actuellement le plus souvent en forme de T, inséré dans l'utérus par le vagin pour prévenir la fécondation et secondairement la nidation. Qu'il soit au cuivre ou hormonal, le DIU peut être mis en place, soit par un médecin soit par une sage-femme. La pose en elle-même est rapide et simple quoique peut-être suivie par des complications précoces ou tardives notamment la perforation utérine et la migration vers les structures de voisinage.

L'incidence de la migration est estimée dans la littérature de 1/10 000 insertions à 1/350 insertions [2, 5]. Dans la littérature nous avons dénombré environ 160 cas de migration intra-abdominale, 80 cas de migration intra vésicale [3]. La complication la plus fréquente est la lithogénèse, plus rarement, une fistule vésico-utérine [4] ou une pyélonéphrite aiguë [6] peuvent se déclarer. La migration est d'autant plus fréquente qu'il existe un utérus cicatriciel ou en raison d'un utérus hypoplasique, d'une rétroversion ou d'une hyper antéversion méconnue [2].

Après perforation, le stérilet peut rester accolé à la paroi utérine, s'entourer par l'épiploon ou migrer dans les organes de voisinage notamment dans la vessie, comme c'est le cas de notre malade. Les complications de cette migration sont variables, actinomyose pelvienne englobant la vessie [5], soit une fistule vésico-utérine [7], une hématurie, néanmoins la lithogénèse, représente la

conséquence la plus fréquente [8].

Cliniquement la perforation utérine par le stérilet est asymptomatique dans la majorité des cas [1] mais peut être suspectée à l'examen devant la disparition des fils repères, après s'être assuré que les fils ne sont pas remontés dans l'endocol.

La symptomatologie urinaire peut être pauvre, ou au contraire la patiente peut présenter un syndrome obstructif ou irritatif comme c'est le cas chez notre patiente. L'examen urologique est souvent sans particularité quoique certains auteurs rapportent les fils du DIU à travers le méat urétral lors des efforts mictionnels [1, 5].

L'abdomen sans préparation met objectivement le stérilet en dehors de l'aire de projection de l'utérus [1-3, 5, 7-9], l'échographie abdominopelvienne à vessie pleine a décrit la présence de calcul intra vésicale sans pouvoir identifier avec précision le DIU. La cystoscopie reste l'examen clé pour le diagnostic de la migration, dans notre cas elle a révélé que c'est une migration partielle avec la présence d'un calcul associé au DIU calcifié.

TDM ou de l'IRM n'est pas bien définie. Elle peut être utile en particulier en cas de migration partielle du DIU dans la vessie nous avons réalisé la TDM pour évaluer le retentissement sur les organes de voisinage.

Souvent l'ablation du matériel se fait par voie endoscopique, par cystoscopie seule en cas de localisation totalement intra - vésicale [1, 5, 8], ou précédée d'une lithotritie [1, 5] en cas de calcul associé. Dans notre cas, vu la migration incomplète, une cystotomie par laparotomie a été réalisée permettant à la fois l'ablation du DIU, du calcul, et la fermeture du défaut au niveau de la paroi postérieure de vessie.

Figure 1:- Image échographique objectivant des opacités avec cône d'ombre postérieur.

Figure 2:- Clichet d abdomen sans preparation montrant le sterillet dans la cavité abdominal.

Figure 3:- Reconstruction scannographique objectivant le DIU et le calcul vésicale.

Figure 4:- coupe scannographique montrant la migration incomplète du DIU.

Figure 5:- Stérilet et calcul après extraction.

Conclusion:-

Le DIU reste une méthode contraceptive efficace, sa pose nécessite en préalable un examen gynécologique afin de dépister les contre indication et d'éviter ainsi les éventuelles complications.

La migration trans-utéro-vésicale est une complication rare, souvent de découverte fortuite mais peut être révélée par une symptomatologie urinaire nécessitant le recours à une exploration radiologique et endoscopique.

Le traitement endoscopique par cystoscopie plus en moins lithotritie est le gold standard mais parfois le recours à la cystotomie et cure chirurgicale de fistule s'impose.

Références:-

1. Feghali J, Bourgi A, Armache Kh. Migration intravésicale
2. d'un dispositif intra-utérin : Cas clinique et revue de la littérature. J Med Liban 2016; 64 (4) : 238-241.
3. Zouhal A, El Amrani N, Bensaid F, El Fehri F, Alaoui MT.
4. Migration intravésicale d'un dispositif intra-utérin. À
5. propos d'un cas. Maghreb Med 1993; 27: 31-5.
6. LANSAC J., LECOMTE P., MARRET H. : Gynécologie pour le praticien 6ème édition, 29 : 239.
7. Haouas N, Sahraoui W, Youssef A, Thabet I, Mosbah AT. Migration intravésicale de dispositif intra-utérin compliquée d'une lithiase. J Gynecol Obstet Biol Reprod
8. 2006; 35: 288-92.
9. Sparks RA, Purrier BG, Watt PJ, Elstein M. Bacteriological colonisation of uterine cavity: role of tailed intra-uterine contraceptive device. Br Med J 1981; 282: 1189-91.
10. Chang CH, Chou CY, Lee WI, Tzeng CC, Liu CH. Pelvic actinomycosis with colo-ileo-vesical fistula formation: report of case. J Formos Med Assoc 1992; 91: 342-5.
11. Schwartzwald D, Mooppan UM, Tancer ML, Gong-Leon G,
12. Kim H. Vesicouterine fistula with menouria: a complication from an intrauterine contraceptive device. J Urol 1986; 136: 1066-7.
13. Maskey CP, Rahman M, Sigdar TK, Johnsen R. Vesical calculus around an intrauterine contraceptive device. Br J Urol 1997; 79: 654-5.