<p>ISSN NO. 2320-5407</p>	<p>Journal Homepage: - www.journalijar.com</p> <h2>INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH (IJAR)</h2> <p>Article DOI: 10.21474/IJAR01/12339 DOI URL: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/12339</p>	<p>INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH (IJAR) ISSN 2320-5407 Journal Homepage: http://www.journalijar.com Journal DOI: 10.21474/IJAR01</p>
---	---	--

RESEARCH ARTICLE

CHORIOANGIOME PLACENTAIRE : A PROPOS D'UN CAS ET REVUES DE LA LITTERATURE

Mehdi Laouze, Sarah Seghrouchni-Idrissi, Mohammed Karamsaoud, Mamouni Nisrine, Errarhaysanae, Bouchikhi Shehrazad and Abd Aziz Bananni

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Service de Gynécologie-Obstétrique 1, CHU Hassan II de Fès, Maroc.

Manuscript Info

Manuscript History

Received: 20 November 2020

Final Accepted: 24 December 2020

Published: January 2021

Abstract

Le chorioangiome placentaire est une tumeur vasculaire bénigne non trophoblastique retrouvée dans environ 1 % des examens histologiques placentaires systématiques. La majorité de ces tumeurs sont de petite taille et sans aucun retentissement fœtomaternel. Ses complications maternelles et fœtales peuvent être sévères dans les cas de chorioangiomes géants symptomatiques (> 4 cm) dont la fréquence est estimée à 1/8000 à 1/50 000 grossesses [1], peuvent être soit des complications fœtales (anémie, thrombocytopenie, hydramnios, anasarque, insuffisance cardiaque, retard de croissance intra-utérin, prématurité et mort in utero) ou maternelles (pré-éclampsie, hématome rétroplacentaire et coagulation intravasculaire disséminée). Le chorioangiome placentaire est rarement associé à l'hémangiome néonatal diffus (HND). Nous rapportant le cas d'un chorioangiome placentaire associé à un hémangiome néonatal cutané

Copy Right, IJAR, 2021., All rights reserved.

Introduction:-

Le chorioangiome placentaire est une tumeur vasculaire bénigne non trophoblastique retrouvée dans environ 1 % des examens histologiques placentaires systématiques. La majorité de ces tumeurs sont de petite taille et sans aucun retentissement fœtomaternel.

Ses complications maternelles et fœtales peuvent être sévères dans les cas de chorioangiomes géants symptomatiques (> 4 cm) dont la fréquence est estimée à 1/8000 à 1/50 000 grossesses [1], peuvent être soit des complications fœtales (anémie, thrombocytopenie, hydramnios, anasarque, insuffisance cardiaque, retard de croissance intra-utérin, prématurité et mort in utero) ou maternelles (pré-éclampsie, hématome rétroplacentaire et coagulation intravasculaire disséminée). Le chorioangiome placentaire est rarement associé à l'hémangiome néonatal diffus (HND).

Nous rapportant le cas d'un chorioangiome placentaire associé à un hémangiome néonatal cutané

Observation:-

Une patiente de 25ans, nullipare deuxième geste, est référée dans notre formation pour accouchement d'une grossesse de 38SA+3J. Ses antécédents et le suivi de sa grossesse sont sans particularité. L'examen échographique met en évidence un volumineux chorioangiome de 61 mm de diamètre ainsi qu'un épaissement diffus du placenta (Fig. 1). Il s'y associe une cardiomégalie et l'examen doppler du canal d'Arantius présente un spectre normal.

Corresponding Author:- Mehdi Laouze

Address:- Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Service de Gynécologie-Obstétrique 1, CHU Hassan II de Fès, Maroc.

L'accélération des flux systoliques au niveau de l'artère cérébrale moyenne, mesuré par effet doppler, laisse suspecter une anémie fœtale.

Figure 1:- Images échographiques à 38SA+3J mettant en évidence un volumineux choriangiome de 61 mm de diamètre ainsi qu'un épaissement diffus du placenta associé une cardiomégalie.

l'accouchement par voie basse a été accepté et s'est déroulé sans incident ; Le nouveau-né est de sexe féminin avec un score d'Apgar de 10 à une minute et à cinq minutes, pesant 3kg200 présentant un hémangiome de 3cm au niveau de l'épaule droit (figure 2).

Figure 2:- Hémangiome de 3cm au niveau de l'épaule droit.

Le placenta, hypertrophique (figure :3), pèse 1200 g et son examen histologique confirme un chorioangiome.

Figure3:- Le placenta, hypertrophique avec un aspect macroscopique d'un choriangiome faisant 7cm.

Discussion:-

Le chorioangiome est la plus fréquente des tumeurs placentaires bénignes. Le diagnostic, confirmé histologiquement, peut être établi in utero par ses caractéristiques échographiques.

. Le diagnostic, confirmé

Il se présente comme une tumeur placentaire bien limitée arrondie ou ovalaire, généralement hypoéchogène, siégeant le plus souvent au contact de la plaque choriale. L'examen doppler permet de mettre en évidence le pédicule vasculaire de la tumeur alors que dans la majorité des cas aucun flux intra tumoral ne peut être détecté (Fig. 1). La taille du chorioangiome et la précocité du diagnostic sont des facteurs pronostics péjoratifs.

Les chorioangiomes supérieurs à 4cm sont associés à 30% de mortalité périnatale dont la moitié in utero [1]. Les complications fœtales ont une origine cardiovasculaire. Elles sont liées, d'une part, à l'importance du shunt gauche-droit dû aux anastomoses artério-veineuses intratumorales. D'autre part, une anémie d'origine hémorragique ou hémolytique peut être aggravée par une thrombopénie également induite par le chorioangiome.

Une surveillance clinique et cardiotocographique régulière est indispensable. L'échographie permettra de réaliser le diagnostic d'une insuffisance cardiaque ou de mettre en évidence les signes évocateurs d'une anémie fœtale avant l'installation d'un tableau d'anasarque, mais il existe peu d'anémie fœtale vraie dans les chorioangiomes symptomatiques, il s'agit le plus souvent d'une hypovolémie. La transfusion pourrait alors provoquer une décompensation cardiaque fœtale. Nous pensons qu'il faut réserver la transfusion in utero aux cas d'hémorragie fœtomaternelle post-fœtoscopie.

En cas de complications diverses approches thérapeutiques sont possibles : l'amniodrainage en cas d'hydramnios important et mal supporté et la transfusion in utero dans l'attente d'une éventuelle extraction prématurée [2].

D'autres auteurs proposent une dévascularisation de la tumeur soit par embolisation soit par ligature soit encore par thermocoagulation laser du pédicule afférent sous contrôle échographique ou fœtoscopique [3,4].

Il n'existait pas de contre-indication à la voie basse chez notre patiente ; en effet il n'y pas de consensus concernant la voie d'accouchement en cas d'anasarque fœtale. Concernant le terme d'accouchement, notre patiente était à 38 SA+3j en travail, donc on a accepté la voie basse conformément aux données de la littérature.

Le pronostic néonatal du chorioangiome placentaire est assez peu discuté dans la littérature, en dehors du cas péjoratif de l'hémangiomatose néonatale diffuse ou des chorioangiomes compliqués de grande taille, dont le taux de mortalité périnatale est élevée (30-40 %) [4]. Ainsi, devant une anémie aigüe néonatale, et en l'absence de saignement évident, le chorioangiome placentaire est un diagnostic, moins fréquent mais néanmoins grave, à éliminer avec d'autres diagnostics différentiels, voire associés tels que l'hémolyse aigüe ou la transfusion fœtoplacentaire. Le diagnostic de certitude repose sur l'examen anatomopathologique du placenta.

En conclusion, lors d'un diagnostic anténatal, il est indispensable de prévenir et de surveiller le risque d'apparition d'une anémie fœtale en organisant le suivi obstétrical et les modalités de la naissance.

Conclusion:-

Les chorioangiomes placentaires doivent être systématiquement recherchés devant un tableau d'hydramnios, d'anasarque, de retard de croissance intra-utérin ou de pré-éclampsie. Le diagnostic de cette tumeur placentaire peut évoquer celui d'hémangiomatose néonatale diffuse. La réalisation d'une cordocentèse pour la recherche de complications hématologiques est indispensable pour une prise en charge périnatale optimale.

References:-

1. Mubiayi N, Cordonier C, Goueff F, Subtil D, Devisme L, Decoq J, et al. Les chorioangiomes placentaires diagnostiqués au second trimestre de la grossesse. *J Gynecol Obstet Biol Reprod* 2002;31:187-92.
2. Amer HZ, Heller DS. Chorangioma and related vascular lesions of the placenta- a review. *Fetal Pediatr Pathol* 2010;29(4):199-206.
3. Noack F, Sotlar K, Thorns C, Smrcek J, Diedrich K, Feller AC, et al. VEGF, KIT protein and neutral endopeptidase (NEP/CD10)-positive myofibroblasts-Precursors of angiogenesis in chorioangiomas? *Placenta* 2003;24(7):758-66.
4. Capelle X, Syrios P, Chantraine F, Rigo V, Schaaps JP, Kridelka F, et al. A rare case of placental chorioangioma associated with neonatal disseminated hemangiomatosis. *J Gynecol Obstet Biol Reprod* 2009;38(3):246-9.