Journal Homepage: -www.journalijar.com

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH (IJAR)

Article DOI:10.21474/IJAR01/13199
DOI URL: <http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/13199>

RESEARCH ARTICLE

EVALUACIÓN DE PREDICTORES PARA BLOQUEO NEUROAXIAL LUMBAR DIFÍCIL MEDIANTE ULTRASONOGRAFÍA

María Julia Gutiérrez Gómez

Manuscript Info

Manuscript History

Received: 25 May 2021
Final Accepted: 29 June 2021
Published: July 2021

Abstract

Introducción: El bloqueo neuroaxial ya sea espinal o epidural, es comúnmente utilizado como técnica anestésica para la ejecución de cirugías o el tratamiento de dolor crónico. En estudios realizados, descritos por autores como Kallidaikurichi et al y Grau et al, ha sido demostrado que aún los anesthesiólogos experimentados son capaces de encontrar el espacio intervertebral adecuado únicamente en el 29% de los pacientes sometidos a este tipo de procedimiento anestésico.

Objetivos: Determinar la asociación de parámetros ultrasonográficos con la dificultad técnica del bloqueo neuroaxial lumbar, en pacientes sometidos a cirugía electiva. Tomar las medidas realizadas ecográficamente que incluyan la distancia entre la piel y la apófisis espinosa de L1, L2, L3, L4 y L5. Determinar si se logró visualizar ecográficamente la presencia del ligamento amarillo y/o del ligamento longitudinal posterior. Evaluar si hubo concordancia entre el nivel determinado por técnica de palpación de referencias anatómicas y la exploración ultrasonográfica. Clasificar el nivel de dificultad del bloqueo neuroaxial basándonos en el número de punciones, así como el número de redirecciones de la aguja durante el bloqueo. **Método:** En este estudio se incluyeron 45 expedientes electrónicos de pacientes que fueron sometidos a cirugía electiva en el Centro Médico Naval en un periodo de Mayo de 2019 a Mayo de 2020 y que su técnica anestésica incluyó Bloqueo Neuroaxial Lumbar y que además se les realizó un rastreo ultrasonográfico para recolección de datos anatómicos.

Resultados: Los resultados obtenidos en el análisis de estos no fueron significativos para el objetivo general de nuestro estudio, sin embargo nos ayudaron a concluir que el espacio referido por los anesthesiólogos y el realmente abordado concuerda únicamente en un 68.9%.

Conclusiones: La realización de ultrasonografía previa realización de BNA puede mejorar la ejecución del mismo.

Copy Right, IJAR, 2021., All rights reserved.

Introducción:-

El bloqueo neuroaxial ya sea espinal o epidural, es comúnmente utilizado como técnica anestésica para la ejecución de cirugías o el tratamiento de dolor crónico. El bloqueo epidural es el más usado, ya que tiene la factibilidad de profundir dosis extras de acuerdo a las necesidades del procedimiento quirúrgico, o bien de colocar anestésico de forma continua para manejo del dolor postoperatorio. (1-3)

Dentro de la anatomía del neuroeje, el espacio peridural se extiende desde la base del cráneo y llega a la membrana sacrococcígea. En el canal vertebral también encontramos la médula espinal, la cual alcanza una posición en la edad adulta en L1 o L2; ésta dispone de un revestimiento de tres meninges, piamadre, aracnoides y duramadre. Entre la piamadre y la aracnoides podemos encontrar un espacio virtual llamado espacio subaracnoideo o leptomeníngeo dentro del cual circula líquido cefalorraquídeo, nervios espinales y vasos sanguíneos que irrigan la médula espinal. Es en el interior de estos dos espacios donde se aplican los anestésicos locales para lograr el objetivo. (4-6)

La anestesia espinal y epidural son ampliamente utilizadas para llevar a cabo diferentes procedimientos, ambos con un alto grado de eficacia y seguridad. Esta técnica ha asegurado un menor riesgo para el manejo de los pacientes; no obstante las dificultades técnicas durante la ejecución de la misma pueden ocasionar falla anestésica, dosis subóptimas para llevar a cabo los procedimientos o trauma en el sitio de punción con la aguja empleada. Además de ello, al presentar estas dificultades el riesgo de complicaciones aumenta, tales como cefalea post-punción dural, síndrome de cauda equina, o incluso complicaciones mayores como hematoma epidural, lesión a médula espinal, aracnoiditis o neuroinfección. (1,3,5)

Tradicionalmente esta técnica se realiza a ciegas, basando la ubicación de las estructuras que se desean visualizar con el conocimiento previo de la anatomía de la columna vertebral, además de seguir referencias anatómicas que sirven como guía para el reconocimiento de las mismas. Una revisión exhaustiva de la espalda del paciente previo al procedimiento, siguiendo las referencias anatómicas para la localización de hitos espinales, es un mejor predictor que únicamente basarnos en el hábito corporal o deformidades de la columna. (7) Así pues, la línea de Tuffier es la referencia más comúnmente utilizada para la localización de un espacio intervertebral, la cual se traza imaginariamente del borde superior de una cresta ilíaca a la otra, cruzando en su camino la apófisis espinosa de la vértebra L4 o bien el espacio intervertebral L4-L5. Sin embargo, a pesar de tener una alta tasa de éxito, se ha demostrado en diferentes estudios que este método no es el más adecuado para la identificación de las vértebras y sus espacios correspondientes. (8-11)

En estudios realizados, descritos por autores como Kallidaikurichi et al y Grau et al, ha sido demostrado que aún los anestesiólogos experimentados son capaces de encontrar el espacio intervertebral adecuado únicamente en el 29% de los pacientes sometidos a este tipo de procedimiento anestésico. En la mayoría de los casos el nivel realmente abordado fue uno superior al elegido, y en el resto de los casos fue de uno a dos inferiores a este último. La importancia de la adecuada elección del espacio intervertebral a intervenir radica en evitar la posible lesión al cono medular al insertar la aguja; es sabido que en adultos el cono medular termina a nivel de L1 sin embargo, existen variaciones anatómicas en la posición de la terminación del mismo, siendo crucial la adecuada selección del espacio intervertebral donde se llevará a cabo el procedimiento anestésico. (12-14)

En la práctica anestésica, la técnica de bloqueo neuroaxial es considerado el procedimiento de mayor dificultad entre las habilidades manuales aprendidas por los anestesiólogos sin embargo, aun sabiendo el grado de dificultad que esta técnica representa y siendo de las más utilizadas, se cuentan con muy pocos estudios que busquen los predictores de dificultad o éxito de los bloqueos neuroaxiales. (4,7)

El objetivo del presente trabajo es determinar la asociación de los hallazgos estructurales encontrados por ultrasonografía con las características físicas de los pacientes y la dificultad técnica para la adecuada ejecución del bloqueo neuroaxial, estableciendo con ello factores predictores de bloqueo neuroaxial difícil y así anticipar el uso de ultrasonografía para asegurar el éxito del manejo en pacientes que serán sometidos a cirugías selectivas en el Centro Médico Naval y que su abordaje anestésico incluya esta técnica.

Métodos:-

Para este estudio incluimos a todos los pacientes que fueron sometidos a cirugías electivas en cuyo procedimiento anestésico incluya la colocación de un bloqueo neuroaxial y que se les haya realizado medición ultrasonográfica con recolección de características anatómicas, en el periodo constituido de Mayo de 2019 a Mayo de 2020 en el Centro Médico Naval.

Procedimiento de estudio

Después de obtener la aceptación por el Comité de Bioética y Comité de Metodología de la Investigación, se procedió a incluir al estudio a pacientes mayores de edad, que fueron sometidos a cirugía selectiva y que la técnica anestésica de elección para su procedimiento incluyó bloqueo neuroaxial.

Una vez habiendo firmado el consentimiento correspondiente y con el paciente en sala de preanestesia, se procedió a colocarlo en posición decúbito lateral derecho o izquierdo con las piernas flexionadas en dirección del abdomen para iniciar el estudio. Se inició el primer escaneo, el cual se realizó por el investigador principal y siempre bajo supervisión estrecha del experto en ultrasonografía y asesor de investigación de este estudio para asegurar un adecuado escaneo. Colocando el transductor curvo en línea media por encima de la línea interglútea en posición transversal, se localiza el sacro observándolo como una línea hiperecoica continua y dentada gracias a la fusión de sus huesos. (1,3,9)

Al encontrarlo, deslizamos el transductor en dirección cefálica, con lo que encontraremos los procesos espinosos lumbares que aparecerán como pequeñas imágenes espicudas hiperecoicas superficiales. Una vez ubicada la apófisis espinosa de L5, procederemos a medir la distancia que existe entre la piel y la misma; al terminar continuaremos hasta ubicar el espacio intervertebral L4-L5, centrándonos en la presencia o ausencia del ligamento amarillo y ligamento longitudinal posterior. Definiendo entonces la calidad de las vistas obtenidas como "Buena" si se lograron ver ambos ligamentos, "Regular" si solo se obtuvo la vista de uno de ellos y "Mala" si ninguno de ellos logró visualizarse con el escaneo. Todo ello se realizó en cada una de las vertebrae lumbares y espacios intervertebrales restantes, hasta llegar a L1. (2,3,19,28)

Este primer escaneo se realizó asegurándonos de que el médico encargado de efectuar el BNA no tuviera conocimiento de los hallazgos encontrados, para que el procedimiento que este último ejecutara fuera totalmente a ciegas. Posteriormente se ingresó a sala de quirófano al paciente y una vez colocado el monitoreo básico del mismo, se procedió a colocarlo nuevamente al paciente en posición de decúbito lateral izquierdo o derecho y se inició el procedimiento de BNA por técnica de palpación, el operador mencionó el espacio intervertebral elegido para el procedimiento y el investigador principal le registró en la hoja de recolección de datos. Durante la realización del procedimiento, el investigador tomó nota del número de veces que el operador realizó direcciones de las agujas, punciones extras a la inicial y/o la necesidad de efectuar cambios de espacio intervertebral elegido para lograr al éxito del bloqueo. Clasificamos el BNA como fácil o difícil según Chin et al, donde describen que BN se define como un procedimiento en el cual el médico que lo realice requiera más de 2 punciones (las punciones se incluyen desde la primera vez que la aguja es insertada en la piel y todas las subsecuentes a ella), o más de 10 redirecciones (cualquier cambio de la dirección inicial de inserción de la aguja que no salga por completo de la piel del paciente) para concluirlo. (2-5,23)

Al finalizar el procedimiento anestésico, se realizó un segundo y último escaneo por ultrasonografía de la columna lumbar para corroborar la concordancia del espacio intervertebral elegido por el operador con el realmente abordado para el bloqueo neuroaxial lumbar, se anotaron las características encontradas en la anatomía del paciente y se correlacionaron con predictores de un BN difícil. Todos los datos recabados fueron resguardados dentro de la institución en formato Excel para su posterior análisis estadístico.

Resultados:-

Se analizaron un total de 45 expedientes de pacientes sometidos a cirugía electiva y que su procedimiento anestésico incluyó la colocación de un bloqueo neuroaxial, a los cuales además se les haya realizado medición ultrasonográfica con recolección de características anatómicas en el periodo constituido de Mayo de 2019 a Mayo de 2020 en el Centro Médico Naval; con un mismo total de punciones con un media de 1.64, con un mínimo de una y máxima de tres ($DE \pm 0.743$) y el número de redirecciones media de 3.22, mínima de dos y máxima de 16 ($DE \pm 3.227$).

En cuanto a la profundidad de la apófisis espinosa L1 4.08 cm ($DE \pm 0.10$) mínimo 1.10 cm y máximo 1.3 cm; L2 la media fue de 4.8 cm ($DE \pm 18.5$); L3 media de 4.53 ($DE \pm 21.4$) mínima de 1.16 y máxima de 1.45.0 cm; L4 y L5 media de 1.36 ($DE \pm 0.09$) mínimo 1.16 y máximo 1.50 respectivamente.

Tabla 1:-

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar
NUMERO_PUNCIONES	45	1	3	1.64	.743

NUMERO_REDIRECCIONES	45	2	16	6.36	3.227
PROF_APOF_L1	45	1.10	1.50	1.3004	.10000
PROF_APOF_L2	45	1.13	126.00	4.0824	18.58772
PROF_APOF_L3	45	1.16	145.00	4.5300	21.41612
PORF_APOF_L4	45	1.16	1.50	1.3607	.09350
PORF_APOF_L5	45	1.16	1.50	1.3376	.08488
N válido (por lista)	45				

PLA L1 – L2 media de 3.33 (DE± 1.2) con un máximo de 4.20; PLA L2 – L3 media de 3.30 (DE± 1.44) máxima de 4.33; L4 – L5 media de 3.73 (DE± 1.35) máxima de 4.8; L5 - L6 media de 14.06 (DE ± 65.7) máxima de 445. Para los valores de PLP L1 – L2 la media fue de 15.7 (DE± 75.5) máximo de 511.0; L2 – L3 media de 16.2 (DE± 16.21) máximo de 532.0; para L3 – L4 media de 17.1 (DE± 83.3) máxima de 564; L4 – L5 media de 18.59 (DE± 87.4).

Tabla2:-

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desviaciónestándar
PLA_L1_L2	45	.00	4.20	3.3324	1.20872
PLA_L2_L3	45	.00	4.33	3.3076	1.44594
PLA_L4_L5	45	.00	4.80	3.7304	1.35497
PLA_L5_L6	45	.00	445.00	14.0656	65.71416
PLP_L1_L2	45	.00	511.00	15.7056	75.52904
PLP_L2_L3	45	.00	532.00	16.2173	78.65622
PLP_L3_L4	45	.00	564.00	17.1538	83.39318
PLP_L4_L5	45	.00	592.00	18.5900	87.43018
N válido (por lista)	45				

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desviaciónestándar
VIL_L1_L2	45	0	2	1.78	.471
VIL_L2_L3	45	0	2	1.71	.549
VIL_L3_L4	45	0	2	1.76	.529
VIL_L4_L5	45	0	2	1.87	.457
N válido (por lista)	45				

La ejecución de másalta fue para <2P/<10R con el 77.8% n= 35 de los casos y para >2P/>10R de 22.2% n= 10, esto tomado como ejecución fácil.

EJECUCION_FACIL

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	<2P/<10R	35	77.8	77.8	77.8
	>2P/>10R	10	22.2	22.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

La determinación por palpación másalta fue L3 – L4 con el 51% n=23, L2 – L3 con 30% n=13 y L4 – L5 20% n= 9. Encuanto a ... BNA determinado por USG L3 – L4 fue de 68.9% n= 31, L4 – L5 con 17.8% n= 8 y finalmente L2 – L3 con el 13.3% n= 6. Para los valores de VIL L1 – L2 los datos obtenidos fueron buena 80% n= 36, regular 17.8% n= 8 y mala 2.2% n= 1. Para VIL L2 – L3 buena 75.6% n=34, regular 20% n= 9 y mala 4.4% n= 2. VIL L3 – L4 buena 80%, regular 15.6% n= 7 y mala 4.4% n= 2 finalmente para L4 – L5 buena 91.1% n= 41, regular y mala 4.4% n= 2 respectivamente.

Rangos			
	EJECUCION_FACIL	N	Rangopromedio
PLA_L1_L2	<2P/<10R	35	21.84

	>2P/>10R	10	27.05
	Total	45	
PLA_L2_L3	<2P/<10R	35	22.99
	>2P/>10R	10	23.05
	Total	45	
PLA_L4_L5	<2P/<10R	35	23.54
	>2P/>10R	10	21.10
	Total	45	
PLA_L5_L6	<2P/<10R	35	23.81
	>2P/>10R	10	20.15
	Total	45	

En base a la prueba H de Kruskal – Wallis entre la ejecución fácil y su asociación con el ligamento amarillo no se encontraron diferencias significativas entre estos en base a la significancia $p > 0.05$. Del mismo modo para el ligamento posterior tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas

Rangos			
	EJECUCION_FACIL	N	Rangopromedio
PLP_L1_L2	<2P/<10R	35	24.89

	>2P/>10R	10	16.40
	Total	45	
PLP_L2_L3	<2P/<10R	35	24.86
	>2P/>10R	10	16.50
	Total	45	
PLP_L3_L4	<2P/<10R	35	24.97
	>2P/>10R	10	16.10
	Total	45	
PLP_L4_L5	<2P/<10R	35	25.00
	>2P/>10R	10	16.00
	Total	45	

Discusión:-

El objetivo principal de estesis es determinar la asociación de parámetros ultrasonográficos con la dificultad técnica del bloqueo neuroaxial lumbar. Los resultados obtenidos en nuestro estudio, en base a la prueba H de Kruskal – Wallis, arrojaron que entre la ejecución fácil y su asociación con el ligamento amarillo, no se encontraron diferencias significativas entre estos en base a la significancia $p > 0.05$. Del mismo modo tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas para el ligamento longitudinal posterior.

Por otro lado, la determinación por palpación por el anestesiólogo más alta fue L3 – L4 con el 51% $n=23$, L2 – L3 con 30% $n=13$ y L4 – L5 20% $n= 9$. A diferencia del espacio realmente abordado que fue determinado por USG L3 – L4 fue de 68.9% $n= 31$, L4 – L5 con 17.8% $n= 8$ y finalmente L2 – L3 con el 13.3% $n= 6$.

Es importante considerar que solo 45 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión del estudio, sin embargo si se pudiera analizar un mayor número de pacientes y con una proyección prospectiva, podríamos obtener resultados favorables; ya que como se observa en la literatura descrita, la realización de ultrasonografía para determinar el espacio intervertebral adecuado para la ejecución de BNA, mejora la ejecución de los mismos al disminuir el número de punciones y redirecciones necesarias para lograr el éxito del mismo.

Conclusiones:-

1. La realización de escaneó ultrasonográfico previa ejecución de bloqueo neuroaxial, podría ser benéfico para los pacientes al disminuir el número de punciones para lograr el éxito del mismo.
2. El espacio elegido por el anestesiólogo con el realmente abordado al ser comprobado por ultrasonografía coincide en 68.9% de los casos, sin embargo esto mejoraría al escaneo previo a la realización del BNA.
3. No se encontraron diferencias significativas entre la visualización o no de los ligamentos amarillo y longitudinal posterior y la ejecución del BNA
4. Se requieren de estudios con mayor número de muestras para obtención de resultados favorables.

Recomendaciones:-

1. Realizar rastreo ultrasonográfico previo a curugías selectivas en curugías anestésicas se incluya el bloqueo neuroaxial, siempre que sea posible.
2. Si el rastreo ultrasonográfico no se realiza previa ejecución de BNA, realizarlo posterior al mismo para corroborar coincidencia de espacio pensado con el realmente elegido.
3. Llevar a la práctica este procedimiento como rutinario para mejorar la ejecución de los BNA.

Bibliografía:-

1. Parate LH, Manjunath B, Tejesh CA, Pujari V. Inaccurate level of intervertebral space estimated by palpation: The ultrasonic revelation. Saudi J Anaesth. 2016;10(3):270–5.
2. Perlas A, Chaparro LE, Chin KJ. Lumbar neuraxial ultrasound for spinal and epidural anesthesia: A systematic review and meta-analysis. Reg Anesth Pain Med. 2016;41(2):251–60.
3. Chin KJ, Ramlogan R, Arzola C, Singh M, Chan V. The utility of ultrasound imaging in predicting ease of performance of spinal anesthesia in an orthopedic patient population. Reg Anesth Pain Med. 2013;38(1):34–8.
4. Perlas A. Evidence for the use of ultrasound in neuraxial blocks. Reg Anesth Pain Med. 2010;35(2 Suppl):43–6.

5. Chin KJ, Perlas A, Chan V. The ultrasound-assisted paraspinous approach to lumbar neuraxial blockade: A simplified technique in patients with difficult anatomy. *Acta Anaesthesiol Scand*. 2015;59(5):668–73.
6. Gambling DR. Lumbar ultrasound: Useful gadget or time-consuming gimmick? *Int J Obstet Anesth [Internet]*. 2011;20(4):318–20. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijoa.2010.10.001>
7. Chien I, Lu I, Wang F, Soo L, Yu K, Tang C. SPINAL PROCESS LANDMARK AS A PREDICTING FACTOR FOR DIFFICULT EPIDURAL BLOCK: A PROSPECTIVE STUDY IN THAIWANESE PATIENTS. 2003;563–7.
8. Karmakar MK, Li X, Kwok WH, Ho AMH, Ngan Kee WD. Sonoanatomy relevant for ultrasound-guided central neuraxial blocks via the paramedian approach in the lumbar region. *Br J Radiol*. 2012;85(1015).
9. Soni NJ, Franco-Sadud R, Schnobrich D, Dancel R, Tierney DM, Salame G, et al. Ultrasound guidance for lumbar puncture. *Neurol Clin Pract*. 2016;6(4):358–68.
10. Whitty R, Moore M, Macarthur A. Identification of the lumbar interspinous spaces: Palpation versus ultrasound. *Anesth Analg*. 2008;106(2):538–40.
11. Roca LMC, Sánchez VEO, Montero PC, Quiles AS, Bonmati L. Identificación de factores predictores de técnica epidural dificultosa en la paciente obstétrica. 2013;20(5):216–20.
12. Srinivasan KK, Deighan M, Crowley L, Mckeating K. Spinal anaesthesia for caesarean section: an ultrasound comparison of two different landmark techniques. *Int J Obstet Anaesth [Internet]*. 2014; Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijoa.2014.02.004>
13. Srinivasan KK, Iohom G, Loughnane F, Lee PJ. Conventional landmark-guided midline versus preprocedure ultrasound-guided paramedian techniques in spinal anaesthesia. *Anesth Analg*. 2015;121(4):1089–96.
14. Sprung J, Bourke DL, Grass J, Hammel J, Mascha E, Thomas P, et al. Predicting the Difficult Neuraxial Block: A Prospective Study. 1999;384–9.
15. Seitel A, Sojoudi S, Osborn J, Rasouljian A, Nouranian S, Lessoway VA, et al. Ultrasound-Guided Spine Anesthesia: Feasibility Study of a Guidance System. *Ultrasound Med Biol*. 2016;42(12):3043–9.
16. Ramlogan R, Niazi AU, Jin R, Johnson J, Chan VW, Perlas A. A virtual reality simulation model of spinal ultrasound: Role in teaching spinal sonoanatomy. *Reg Anesth Pain Med*. 2017;42(2):217–22.
17. Kendell J, Wildsmith JAW, Gray IG. Costing anaesthetic practice: An economic comparison of regional and general anaesthesia for varicose vein and inguinal hernia surgery. *Anaesthesia*. 2000;55(11):1106–13.
18. Kim SH, Kim DY, Han JI, Baik HJ, Park HS, Lee GY. Vertebral level of Tuffier's line measured by ultrasonography in parturients in the lateral decubitus position. 2014;67(3):181–5.
19. Chin KJ, Chan VWS, Ramlogan R, Perlas A. Real-time ultrasound-guided spinal anaesthesia in patients with a challenging spinal anatomy: Two case reports. *Acta Anaesthesiol Scand*. 2010;54(2):252–5.
20. Chin KJ, Perlas A, Singh M, Arzola C, Prasad A, Chan V, et al. An ultrasound-assisted approach facilitates spinal anaesthesia for total joint arthroplasty. *Can J Anesth*. 2009;56(9):643–50.
21. Balki M. L'échoguidage, un outil utile pour localiser l'espace péridural chez les patientes en obstétrique. *Can J Anesth*. 2010;57(12):1111–26.
22. Chun EH, Kim JE, Kim DY, Kim YJ, Kim JH, Chung RK, et al. elderly women. 2016;
23. Shaylor R, Bmedsci B, Saifi F, Davidson E, Weiniger CF, Chb MB. High Success Rates Using Ultrasound for Neuraxial Block in Obese Patients. 2016;18(January).
24. Li M, Ni X, Xu Z, Shen F, Song Y, Li Q, et al. Ultrasound-Assisted Technology Versus the Conventional Landmark Location Method in Spinal Anesthesia for Cesarean Delivery in Obese Parturients: A Randomized Controlled Trial. 2018;XXX(Xxx):1–7.
25. Vol REVEA-, Cr L, Art TDE, Perioperative PP, Care C, Cl H. *Revista electrónica de AnestesiaR*. 2019;11(7).
26. Brown-shreves D, Koshkin A, Vaishnav V, IFCARCS. Ultrasound Imaging Facilitates Spinal Anesthesia in Adults with Difficult Surface Anatomic Landmarks. 2011;(1).
27. Creaney M, Mullane D, Casby C, Tan T. Ultrasound to identify the lumbar space in women with impalpable bony landmarks presenting for elective caesarean delivery under spinal anaesthesia: a randomised trial. *Int J Obstet Anesth [Internet]*. 2016;28(December 2013):12–6. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijoa.2016.07.007>
28. Halpern SH, Banerjee A. The use of ultrasound for lumbar spinous process identification: A pilot study Utilisation de l'ultrason pour l'identification de l'apophyse spinieuse lombaire: une étude pilote e. 2010;817–22.
29. McDonald A, Murgatroyd H. *Anestesia Neuroaxial Guiada por Ultrasonido*. 2017;
30. Espinaco, J. *Consideraciones Anatómo-fisiológicas en el bloqueo neuroaxial subaracnoideo*. 2003.